

CAG (Ara-C皮下注)

4週毎

AML, MDS

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~14				
	フィルグラスチム皮下注	75 μ g	s.c.	
	シタラビン	10 mg/m ²	s.c.	1日2回 12時間ごと
Day 1				
	パロノセトロンバッグ	50 mL	d.i.v.	15分
	生理食塩液 アクリラルビシン	100 mL 14 mg/m ²	d.i.v.	200 mL/h
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 2~4				
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
	生理食塩液 アクリラルビシン	100 mL 14 mg/m ²	d.i.v.	200 mL/h
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

CAG (Ara-C静脈注射)

4週毎

AML, MDS

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~14				
	フィルグラスチム皮下注	75 μ g	s.c.	
Day 1				
	パロノセトロンバッグ	50 mL	メイン1 d.i.v.	15分
	生理食塩液 シタラビン	500 mL 20 mg/m ²	メイン2 d.i.v.	24時間
	メイン止めて、側管1,2,3流した後再開			
	生理食塩液	50 mL	側管1 d.i.v.	5分
	生理食塩液 アクリラルビシン	100 mL 14 mg/m ²	側管2 d.i.v.	200 mL/h
	生理食塩液	50 mL	側管3 d.i.v.	5分
Day 2~4				
	生理食塩液 シタラビン	500 mL 20 mg/m ²	メイン d.i.v.	24時間
	メイン止めて、側管1,2,3流した後再開			
	生理食塩液	50 mL	側管1 d.i.v.	5分
	生理食塩液 アクリラルビシン	100 mL 14 mg/m ²	側管2 d.i.v.	200 mL/h
	生理食塩液	50 mL	側管3 d.i.v.	5分
Day 5~14				
	生理食塩液 シタラビン	500 mL 20 mg/m ²	d.i.v.	24時間