

## BEP

## 3週毎

## 胚細胞腫瘍

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1, 3, 4, 5				
	乳酸Naリンゲル液	500 mL	d.i.v.	60分
	グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 9.9 mg	d.i.v.	30分
	生理食塩液 エトポシド	500 mL 100 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	120分
	生理食塩液 シスプラチン	400 mL 20 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	120分
	乳酸Naリンゲル液	1000 mL	d.i.v.	180分
Day 2				
	乳酸Naリンゲル液	500 mL	d.i.v.	60分
	グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 9.9 mg	d.i.v.	30分
	生理食塩液 ブレオマイシン	100 mL 20 mg/m <sup>2</sup> (最大30 mg)	d.i.v.	200 mL/h
	生理食塩液 エトポシド	500 mL 100 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	120分
	生理食塩液 シスプラチン	400 mL 20 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	120分
	乳酸Naリンゲル液	1000 mL	d.i.v.	180分
Day 9, 16				
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
	生理食塩液 ブレオマイシン	100 mL 20 mg/m <sup>2</sup> (最大30 mg)	d.i.v.	200 mL/h
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用