

DCd皮下注①(1サイクル目)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服

Day 1, 2, 8, 15, 22

アセトアミノフェン(500)2錠

ジフェンヒドラミン(10)5錠

モンテルカスト(10)1錠

Day 3 *1サイクル目のみ

プレドニゾン(5)3錠内服

Day 1, 2

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	20 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	1本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

ダラキューロ®	1800mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	-------------	------	-----------

Day 3

プレドニゾン(5)	3錠	p.o.	
-----------	----	------	--

Day 8

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

ダラキューロ®	1800mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	-------------	------	-----------

Day 9

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 15

生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	100 mL 56 mg/m ²	d.i.v.	30分
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
ダラキューロ®	1800mg/body	s.c.	3~5分かけて投与

Day 16

生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	100 mL 56 mg/m ²	d.i.v.	30分
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

Day 22

レナデックス®	40 mg/body	p.o.	前投薬として内服
ダラキューロ®	1800mg/body	s.c.	3~5分かけて投与

DCd皮下注②(2サイクル目)

4週毎

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
	<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服 Day 1, 8, 15, 22 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠 モンテルカスト(10)1錠			
Day 1, 8, 15	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
	デキサメタゾン	19.8 mg		
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
	カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
	注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
	生理食塩液	50mL	d.i.v.	フラッシュ用
	ダラキューロ®	1800mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
Day 2, 9, 16	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
	デキサメタゾン	19.8 mg		
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
	カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
	注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 22	レナデックス®	40 mg/body	p.o.	前投薬として内服
	ダラキューロ®	1800mg/body	s.c.	3~5分かけて投与

DCd皮下注③(3~6サイクル目)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服

Day 1, 15

アセトアミノフェン(500)2錠

ジフェンヒドラミン(10)5錠

モンテルカスト(10)1錠

Day 1, 15

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

ダラキューロ®	1800mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	-------------	------	-----------

Day 2, 8, 9, 16

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 22

レナデックス®	40 mg/body	p.o.	
---------	------------	------	--

DCd皮下注④(7サイクル目以降)

4週毎

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
	<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服 Day 1 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)5錠 モンテルカスト(10)1錠			
Day 1	生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	100 mL 56 mg/m ²	d.i.v.	30分
	注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
	ダラキューロ®	1800mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
Day 2, 8, 9, 15, 16	生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	100 mL 56 mg/m ²	d.i.v.	30分
	注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 22	レナデックス®	40 mg/body	p.o.	