

## お知らせ

令和4年4月1日

### 造影 CT 検査時のビグアイド薬の調整方法について

経口血糖降下剤の「ビグアイド薬」について、以前は、ヨード造影剤との併用で乳酸アシドーシスを起こす可能性があるため、ヨード造影剤を使用する検査時は中止が望ましいとされていましたが、下記のように厚生労働省のガイドラインが一部変更となっております。

「**ビグアイド薬はヨード造影剤との併用で乳酸アシドーシスを起こす可能性があるため、造影検査前48時間は可能な限り中止、造影剤検査後48時間は内服中止とする**」

したがって、患者の安全のために、当院でも厚労省のガイドラインに沿って、造影CT検査前後のビグアイド薬の内服について別紙のとおりとしております。

検査予約の際、患者にご指導よろしく願いいたします。

なお、ご不明な点がございましたら、ご連絡いただけましたら幸いです。

今後とも、ご協力お願い致します。

#### 【お問い合わせ】

君津中央病院

患者総合支援センター

TEL 0438 (36) 1069

(紹介予約専用ダイヤル)

# 下の写真の“糖尿病薬”を飲まれている方は 造影CT検査や尿路造影検査を受ける前に 放射線科スタッフにお知らせください

## メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「三和」「トーワ」「日医工」「ニプロ」「明治」「DSEP」「DSPB」「JG」「TCK」「TE」「VTRS」



## メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「三和」「トーワ」「日医工」「ニプロ」「明治」「DSEP」「DSPB」「JG」「TCK」「TE」「VTRS」



### メトグルコ錠 250mg 500mg



### メトホルミン塩酸塩錠 250mg SN



### グリコラン錠 250mg



### イニシンク配合錠



### メタクト配合錠 LD HD



### イクメット配合錠 LD HD



### メトアナ配合錠 LD HD



### ジベトス錠 50mg



### ブホルミン塩酸塩 腸溶錠 50mg KO

