

pora R-B (3day)

3週毎(6サイクルまで) DLBCL(再発)

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>リツキシマブ、ポラツズマブ投与30分前に内服
Day 1, 2
抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

Day 1

生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
ヒドロコルチゾン	100 mg		

生理食塩液	500 mL		
リツキシマブ	375 mg/m ²	d.i.v.	初回50→100→150→200 mg/h(30分毎) 二回目以降100→200→300→400 mg/h(30分毎)

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2

グラニセトロンバッグ	100 mL		
デキサメタゾン	6.6 mg	d.i.v.	30分

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

生理食塩液	50 mL		
ポラツズマブ ベドチン	1.8 mg/kg	d.i.v.	初回90分、2回目以降30分 フィルター付きラインを使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ポラツズマブ調製用

* ポラツズマブ ベドチンが135 mgを超える場合は、生理食塩液 100 mLに希釈する

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

生理食塩液	50 mL		
ベンダムスチン	90 mg/m ²	d.i.v.	10分

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 3

グラニセトロンバッグ	100 mL		
デキサメタゾン	6.6 mg	d.i.v.	30分

生理食塩液	50 mL		
ベンダムスチン	90 mg/m ²	d.i.v.	10分

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------