

R-CEOP (1day)

3週毎

B細胞性非ホジキンリンパ腫

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>リツキシマブ投与30分前に内服

Day 1

抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

Day 1

生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
ヒドロコルチゾン	100 mg		

生理食塩液	500 mL	d.i.v.	初回50→100→150→200 mg/h(30分毎)
リツキシマブ	375 mg/m ²		二回目以降100→200→300→400 mg/h(30分毎)

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

グラニセトンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
-----------	--------	--------	-----

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	60分
エトポシド	50 mg/m ²		

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	全開
ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最大2 mg)		

生理食塩液	500 mL	d.i.v.	250 mL/h
シクロホスファミド	750 mg/m ²		

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2, 3

エトポシド	100 mg/m ²	p.o.	
-------	-----------------------	------	--

Day 1～5

プレドニゾン	100 mg/body 60 mg/body (70才以上)	p.o.	5日分
--------	-----------------------------------	------	-----