

R-GCD (2day)

3週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>リツキシマブ投与30分前に内服

Day 1

抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

Day 1

生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
ヒドロコルチゾン	100 mg		

生理食塩液	500 mL	d.i.v.	初回50→100→150→200 mg/h(30分毎)
リツキシマブ	375 mg/m ²		二回目以降100→200→300→400 mg/h(30分毎)

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2

グラニセトロンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
デキサメタゾン	39.6 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	200 mL/h
ゲムシタビン	1000 mg/m ²		

生理食塩液	250 mL	d.i.v.	60分
カルボプラチン	AUC 5		

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 9

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	6.6 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	200 mL/h
ゲムシタビン	1000 mg/m ²		

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 3~5

デカドロン®	40 mg/body	p.o.	3日分
--------	------------	------	-----