

エプコリタマブ皮下注① (1サイクル目)4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25			
プレドニゾロン	100 mg/body	p.o.	Day1, 8, 15, 22は前投薬として内服

＜前投薬＞エプコリタマブ投与30分～2時間前に内服
 Day 1, 8, 15, 22
 アセトアミノフェン(500)2錠
 ジフェンヒドラミン(10)5錠

Day 1			
乳酸Naリンゲル液	500 mL	d.i.v.	120分
エプコリタマブ (生理食塩液4.2mLで希釈し、更に8mLで希釈)	0.16 mg/body	s.c.	
生理食塩液(20mL)	1本		エプコリタマブ調製用

Day 8			
乳酸Naリンゲル液	500 mL	d.i.v.	120分
エプコリタマブ (生理食塩液4.2mLで希釈)	0.8 mg/body	s.c.	
生理食塩液(20mL)	1本		エプコリタマブ調製用

Day 15, 22			
乳酸Naリンゲル液	500 mL	d.i.v.	120分
エプコリタマブ	48 mg/body	s.c.	

*投与前後に水分摂取(投与前24時間に2～3L、投与後24時間に2～3L)

エプコリタマブ皮下注② (2～3サイクル目)4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1, 8, 15, 22			
乳酸Naリンゲル液	500 mL	d.i.v.	120分
エプコリタマブ	48 mg/body	s.c.	

エプコリタマブ皮下注③ (4～9サイクル目)4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1, 15			
乳酸Naリンゲル液	500 mL	d.i.v.	120分
エプコリタマブ	48 mg/body	s.c.	

エプコリタマブ皮下注④ (10サイクル目以降)4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1			
乳酸Naリンゲル液	500 mL	d.i.v.	120分
エプコリタマブ	48 mg/body	s.c.	