

pola R-CHP (1day)

3週毎(2~6サイクルまで) DLBCL(未治療)

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>リツキシマブ投与30分前に内服

Day 1

抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

Day 1

生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
メチルプレドニゾロン	40 mg		

生理食塩液	全量250 mL		
リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	

<投与速度> 0~30分:100 mL/h, 30~90分:200 mL/h

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

グラニセトロンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
------------	--------	--------	-----

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

生理食塩液	50 mL		30分
ポラツズマブ ベドチン	1.8 mg/kg	d.i.v.	フィルター付きラインを使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ポラツズマブ調製用

\*ポラツズマブ ベドチンが135 mgを超える場合は、生理食塩液 100 mLに希釈する

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

生理食塩液	100 mL		
ドキソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	全開

生理食塩液	500 mL		
シクロホスファミド	750 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	250 mL/h

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 1~5

プレドニゾロン	100 mg/body	p.o.	5日分
---------	-------------	------	-----

\*7、8 サイクル目は、リツキシマブ単独(3週毎)を行う