

R-CHOP (2day)

3週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>リツキシマブ投与30分前に内服

Day 1

抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

Day 1

生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
メチルプレドニゾロン	40 mg		

生理食塩液	500 mL		
リツキシマブ	375 mg/m ²	d.i.v.	初回50→100→150→200 mg/h(30分毎) 二回目以降100→200→300→400 mg/h(30分毎)

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2

グラニセトロンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
------------	--------	--------	-----

生理食塩液	100 mL		
ドキシルビシン	50 mg/m ²	d.i.v.	全開

生理食塩液	50 mL		
ビンクリスチン	1.4 mg/m ² (最大2 mg)	d.i.v.	全開

生理食塩液	500 mL		
シクロホスファミド	750 mg/m ²	d.i.v.	250 mL/h

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2～6

プレドニゾロン	100 mg/body 60 mg/body (70才以上)	p.o.	5日分
---------	-----------------------------------	------	-----