

## R-GCD (1day)

## 3週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>リツキシマブ投与30分前に内服

Day 1

抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

Day 1

生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
メチルプレドニゾロン	40 mg		

生理食塩液	全量250 mL		
リツキシマブ	375 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	

<投与速度> 0~30分:100 mL/h, 30~90分:200 mL/h

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

グラニセトロンバッグ	100 mL		
デキサメタゾン	39.6 mg	d.i.v.	30分

生理食塩液	100 mL		
ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	200 mL/h

生理食塩液	250 mL		
カルボプラチン	AUC 5	d.i.v.	60分

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 8

生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	6.6 mg	d.i.v.	15分

生理食塩液	100 mL		
ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	200 mL/h

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 2~4

デカドロン®	40 mg/body	p.o.	3日分
--------	------------	------	-----