

pola R-B (2day)**3週毎(計6サイクルまで) DLBCL(再発)**

* 本レジメンは2回目以降に使用

薬品名	投与量	手技	点滴時間
<前投薬>リツキシマブ投与30分前に内服			
Day 1 抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬			
Day 1			
生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン 5 mg	1A	d.i.v.	15分
メチルプレドニゾロン	40 mg		
生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	
リツキシマブ	375 mg/m ²		
<投与速度> 0~30分:100 mL/h, 30~90分:200 mL/h			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
グラニセトロンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	30分
ポラツズマブ ベドチン	1.8 mg/kg	d.i.v.	フィルター付きラインを使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ポラツズマブ調製用
* ポラツズマブ ベドチンが135 mgを超える場合は、生理食塩液 100 mLに希釀する			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	10分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 2			
グラニセトロンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
デキサメタゾン	6.6 mg		
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	10分
ベンダムスチン	90 mg/m ²		
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用