

m-FOLFOX6/C-mab(初回)2週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

Day 1

グラニセトロンバッグ	100 mL		
デキサメタゾン	9.9 mg	d.i.v.	30分
クロルフェニラミン5 mg	1A		

生理食塩液	500 mL		
セツキシマブ	400 mg/m ²	d.i.v.	120分

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

5%ブドウ糖液	250 mL		
レボホリナート	200 mg/m ²	d.i.v.	125 mL/h
			オキサリプラチンと同時に

5%ブドウ糖液	250 mL		
オキサリプラチン	85 mg/m ²	d.i.v.	120分
			レボホリナートと同時に

生理食塩液	50 mL		
5-FU	400 mg/m ²	d.i.v.	5分

生理食塩液	全量100 mL		
5-FU	2400 mg/m ²	ポンプ	46時間 持続点滴

Day 8

生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	3.3 mg	d.i.v.	15分
クロルフェニラミン5 mg	1A		

生理食塩液	250 mL		
セツキシマブ	250 mg/m ²	d.i.v.	60分

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

m-FOLFOX6/C-mab(2回目以降)2週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

Day 1

グラニセトロンバッグ デキサメタゾン クロルフェニラミン5 mg	100 mL 9.9 mg 1A	d.i.v.	30分
--	------------------------	--------	-----

生理食塩液 セツキシマブ	250 mL 250 mg/m ²	d.i.v.	60分
-----------------	---------------------------------	--------	-----

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

5%ブドウ糖液 レボホリナート	250 mL 200 mg/m ²	d.i.v.	125 mL/h オキサリプラチン と同時に
--------------------	---------------------------------	--------	------------------------------

5%ブドウ糖液 オキサリプラチン	250 mL 85 mg/m ²	d.i.v.	120分 レボホリナート と同時に
---------------------	--------------------------------	--------	-------------------------

生理食塩液 5-FU	50 mL 400 mg/m ²	d.i.v.	5分
---------------	--------------------------------	--------	----

生理食塩液 5-FU	全量100 mL 2400 mg/m ²	ポンプ	46時間 持続点滴
---------------	------------------------------------	-----	-----------

Day 8

生理食塩液 デキサメタゾン クロルフェニラミン5 mg	50 mL 3.3 mg 1A	d.i.v.	15分
-----------------------------------	-----------------------	--------	-----

生理食塩液 セツキシマブ	250 mL 250 mg/m ²	d.i.v.	60分
-----------------	---------------------------------	--------	-----

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----