

|       | 薬品名                                    | 投与量                                | 手技     | 点滴時間                         |
|-------|--|------------------------------------|--------|------------------------------|
| 連日    | エンコラフェニブ                               | 300 mg/回                           | p.o.   | 1日1回                         |
| Day 1 | グラニセトロンバッグ<br>デキサメタゾン<br>クロルフェニラミン5 mg | 100 mL<br>9.9 mg<br>1A             | d.i.v. | 30分                          |
|       | 生理食塩液<br>セツキシマブ                        | 500 mL<br>500 mg/m <sup>2</sup>    | d.i.v. | 120分                         |
|       | 生理食塩液                                  | 50 mL                              | d.i.v. | 5分                           |
|       | 5%ブドウ糖液<br>レボホリナート                     | 250 mL<br>200 mg/m <sup>2</sup>    | d.i.v. | 125 mL/h<br>オキサリプラチン<br>と同時に |
|       | 5%ブドウ糖液<br>オキサリプラチン                    | 250 mL<br>85 mg/m <sup>2</sup>     | d.i.v. | 120分<br>レボホリナート<br>と同時に      |
|       | 生理食塩液<br>5-FU                          | 50 mL<br>400 mg/m <sup>2</sup>     | d.i.v. | 5分                           |
|       | 生理食塩液<br>5-FU                          | 全量100 mL<br>2400 mg/m <sup>2</sup> | ポンプ    | 46時間 持続点滴                    |