

## mLSG15 (VCAP-AMP-VECP)

## 4週毎 成人T細胞白血病リンパ腫

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1	グラニセトンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
	生理食塩液 ドキシソルピシン	100 mL 40 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	全開
	生理食塩液 ビンクリスチン	50 mL 1 mg/m <sup>2</sup> (最大2 mg)	d.i.v.	全開
	生理食塩液 シクロホスファミド	500 mL 350 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	250 mL/h
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
	プレドニゾロン	40 mg/m <sup>2</sup>	p.o.	
Day 8	グラニセトンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
	生理食塩液 ドキシソルピシン	100 mL 30 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	全開
	生理食塩液 ラニムスチン	100 mL 60 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	30分
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
	プレドニゾロン	40 mg/m <sup>2</sup>	p.o.	
Day 15	グラニセトンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
	生理食塩液 ビンデシン	50 mL 2.4 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	全開
	生理食塩液 エトポシド	500 mL 100 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	120分
	生理食塩液 カルボプラチン	250 mL 250 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	60分
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
	プレドニゾロン	40 mg/m <sup>2</sup>	p.o.	
Day 16, 17	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
	生理食塩液 エトポシド	500 mL 100 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	120分
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
	プレドニゾロン	40 mg/m <sup>2</sup>	p.o.	