

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>イノツズマブ オゾガマイシン
 投与30分~2時間前に内服
 Day 1, 8, 15
 アセトアミノフェン(500)2錠
 ジフェンヒドラミン(10)5錠

Day 1

グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 9.9 mg	d.i.v.	30分
-----------------------	------------------	--------	-----

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	60分
イノツズマブ オゾガマイシン	0.8 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	1本		イノツズマブ オゾガマイシン調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 8, 15

グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 9.9 mg	d.i.v.	30分
-----------------------	------------------	--------	-----

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	60分
イノツズマブ オゾガマイシン	0.5 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	1本		イノツズマブ オゾガマイシン調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

* イノツズマブ オゾガマイシンは遮光で調製から投与まで行う。溶解から8時間以内に投与を終了すること。

薬品名	投与量	手技	点滴時間
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <前投薬>イノツズマブ オゾガマイシン 投与30分~2時間前に内服 Day 1, 8, 15 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドรามミン(10)5錠 </div>			
Day 1, 8, 15			
グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 9.9 mg	d.i.v.	30分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液 イノツズマブ オゾガマイシン	50 mL 0.5 mg/m ²	d.i.v.	60分
注射用水(20 mL)	1本		イノツズマブ オゾガマイシン調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

* イノツズマブ オゾガマイシンは遮光で調製から投与まで行う。溶解から8時間以内に投与を終了すること。

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>イノツズマブ オゾガマイシン
 投与30分~2時間前に内服
 Day 1, 8, 15
 アセトアミノフェン(500)2錠
 ジフェンヒドラミン(10)5錠

Day 1

グラニセトロンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
デキサメタゾン	9.9 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	60分
イノツズマブ オゾガマイシン	0.8 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	1本		イノツズマブ オゾガマイシン調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 8, 15

グラニセトロンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
デキサメタゾン	9.9 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	60分
イノツズマブ オゾガマイシン	0.5 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	1本		イノツズマブ オゾガマイシン調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

* イノツズマブ オゾガマイシンは遮光で調製から投与まで行う。溶解から8時間以内に投与を終了すること。