

## AO①(2サイクル目)

4週毎

CD20陽性慢性リンパ性白血病

薬品名	投与量	手技	点滴時間
<b>連日</b>			
アカラブルチニブ	100 mg/回	p.o.	1日2回
<b>&lt;前投薬&gt;オビヌツズマブ投与30分～1時間前に内服 Day 1, 2, 8, 15 抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬</b>			
<b>Day 1</b>			
生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
メチルプレドニゾロン	40 mg		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	60分
生理食塩液	96 mL	d.i.v.	25mL/h フィルター付きライン
オビヌツズマブ	100 mg/body		を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
<b>Day 2</b>			
生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
メチルプレドニゾロン	40 mg		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	60分
生理食塩液	214 mL	d.i.v.	フィルター付きライン
オビヌツズマブ	900 mg/body		を使用のこと
0～30分:13 mL/h, 30～60分:27 mL/h, 60～90分:41 mL/h, 90～120分:55 mL/h,			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
<b>Day 8, 15</b>			
生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
メチルプレドニゾロン	40 mg		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	60分
生理食塩液	210 mL	d.i.v.	フィルター付きライン
オビヌツズマブ	1000 mg/body		を使用のこと
初回25 mL/hから開始し, 30分毎25 mL/hずつUP可(最大100 mL/h)			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

\* 1サイクル目(28日間)はアカラブルチニブのみ投与を行う

## AO②(3~7サイクル目)

4週毎

CD20陽性慢性リンパ性白血病

薬品名	投与量	手技	点滴時間
<b>連日</b>			
アカラブルチニブ	100 mg/回	p.o.	1日2回
<前投薬>オビヌツズマブ投与30分~1時間前に内服			
Day 1 抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬			
<b>Day 1</b>			
生理食塩液	50 mL		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
メチルプレドニゾロン	40 mg		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	60分
生理食塩液	210 mL		フィルター付きライン
オビヌツズマブ	1000 mg/body	d.i.v.	を使用のこと
初回25 mL/hから開始し、30分毎25 mL/hずつUP可(最大100 mL/h)			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

\* 8サイクル目以降はアカラブルチニブのみ投与を行う