

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1			
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分 ブリナツモマブとは 別ルートで投与
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 27 μg/body	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与 ・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ブリナツモマブ調製用
* ブリナツモマブ輸液バッグでプライミングを行い、設定時間が来たら残破棄すること			
Day 4			
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 36 μg/body	d.i.v.	2.5 mL/h (4日間) 持続投与 ・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること			
Day 8			
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分 ブリナツモマブとは 別ルートで投与
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 84 μg/body	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与 ・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること			
Day 11, 18, 25			
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 112 μg/body	d.i.v.	2.5 mL/h (4日間) 持続投与 ・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること			
Day 15, 22			
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 84 μg/body	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与 ・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること			
Day 29			
生理食塩液	20 mL		2.5 mL/h 1時間投与したら廃棄

薬品名	投与量	手技	点滴時間	
Day 1				
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分	ブリナツモマブとは 別ルートで投与
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 84 μg/body	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与)	・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること				
Day 4, 11, 18, 25				
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 112 μg/body	d.i.v.	2.5 mL/h (4日間) 持続投与)	・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること				
Day 8, 15, 22				
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 84 μg/body	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与)	・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること				
Day 29				
生理食塩液	20 mL		2.5 mL/h	1時間投与したら廃棄

薬品名	投与量	手技	点滴時間	
Day 1				
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分	ブリナツモマブとは 別ルートで投与
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 84 μg/body	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与)	・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること				
Day 4, 11, 18, 25				
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 112 μg/body	d.i.v.	2.5 mL/h (4日間) 持続投与)	・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること				
Day 8, 15, 22				
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 84 μg/body	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与)	・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること				
Day 29				
生理食塩液	20 mL		2.5 mL/h	1時間投与したら廃棄

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1			
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分 ブリナツモマブとは 別ルートで投与
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 15 μ g/m ²	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与 ・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ブリナツモマブ調製用
* ブリナツモマブ輸液バッグでプライミングを行い、設定時間が来たら残破棄すること			
Day 4			
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 20 μ g/m ²	d.i.v.	2.5 mL/h (4日間) 持続投与 ・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること			
Day 8			
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分 ブリナツモマブとは 別ルートで投与
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 45 μ g/m ²	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与 ・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること			
Day 11, 18, 25			
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 60 μ g/m ²	d.i.v.	2.5 mL/h (4日間) 持続投与 ・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること			
Day 15, 22			
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 45 μ g/m ²	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与 ・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本		ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること			
Day 29			
生理食塩液	20 mL		2.5 mL/h 1時間投与したら廃棄

薬品名	投与量	手技	点滴時間	
Day 1				
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分	ブリナツモマブとは 別ルートで投与
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 45 µg/m ²	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与)	・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること				
Day 4, 11, 18, 25				
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 60 µg/m ²	d.i.v.	2.5 mL/h (4日間) 持続投与)	・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること				
Day 8, 15, 22				
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 45 µg/m ²	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与)	・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること				
Day 29				
生理食塩液注シリンジ	20 mL		2.5 mL/h	1時間投与したら廃棄

薬品名	投与量	手技	点滴時間	
Day 1				
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分	ブリナツモマブとは 別ルートで投与
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 45 µg/m ²	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与)	・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること				
Day 4, 11, 18, 25				
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 60 µg/m ²	d.i.v.	2.5 mL/h (4日間) 持続投与)	・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること				
Day 8, 15, 22				
生理食塩液 生理食塩液 ブリナツモマブ (1Vあたり注射用水3 mLで溶解)	250 mL 20 mL 45 µg/m ²	d.i.v.	3.3 mL/h (3日間) 持続投与)	・生理食塩液270mLに 輸液安定化液5.5mL加える ・フィルター付きラインを 使用のこと
注射用水(20 mL)	1本			ブリナツモマブ調製用
* 設定時間が来たら残破棄すること				
Day 29	生理食塩液	20 mL	2.5 mL/h	1時間投与したら廃棄