

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1			
グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 19.8 mg	d.i.v.	30分
生理食塩液 ペメトレキセド	100 mL 500 mg/m ²	d.i.v.	10分
生理食塩液 カルボプラチニン	250 mL AUC 5	d.i.v.	60分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
アセトアミノフェン1000 mg クロルフェニラミン5 mg	100 mL 1A	d.i.v.	15分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
生理食塩液 アミバンタマブ	243 mL 350 mg/body	d.i.v.	フィルター付きライン を使用のこと
<投与速度> 0~2時間:50 mL/h, 2時間以降:75 mL/h			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
<前投薬>アミバンタマブ投与30分~1時間前に内服			
Day 2, 8, 15			
アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)3錠			
Day 2			
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 9.9 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	130 mL/h
生理食塩液 アミバンタマブ	222 mL 1400 mg/body	d.i.v.	フィルター付きライン を使用のこと
<投与速度> 0~2時間:25 mL/h, 2時間以降:50 mL/h			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 8			
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液 アミバンタマブ	215 mL 1750 mg/body	d.i.v.	65 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 15			
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液 アミバンタマブ	215 mL 1750 mg/body	d.i.v.	85 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1			
グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 9.9 mg	d.i.v.	30分
生理食塩液 ペメトレキセド	100 mL 500 mg/m ²	d.i.v.	10分
生理食塩液 カルボプラチニ	250 mL AUC 5	d.i.v.	60分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
アセトアミノフェン1000 mg クロルフェニラミン5 mg	100 mL 1A	d.i.v.	15分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
生理食塩液 アミバンタマブ	215 mL 1750 mg/body	d.i.v.	125 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1			
グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 9.9 mg	d.i.v.	30分
生理食塩液 ペメトレキセド	100 mL 500 mg/m ²	d.i.v.	10分
生理食塩液 カルボプラチニ	250 mL AUC 5	d.i.v.	60分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
アセトアミノフェン1000 mg クロルフェニラミン5 mg	100 mL 1A	d.i.v.	15分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
生理食塩液 アミバンタマブ	208 mL 2100 mg/body	d.i.v.	125 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

薬品名	投与量	手技	点滴時間
<前投薬>アミバンタマブ投与30分～1時間前に内服			
Day 1 アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)3錠			
Day 1			
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液 ペメトレキセド	100 mL 500 mg/m ²	d.i.v.	10分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
生理食塩液 アミバンタマブ	208 mL 2100 mg/body	d.i.v.	125 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1			
グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 19.8 mg	d.i.v.	30分
生理食塩液 ペメトレキセド	100 mL 500 mg/m ²	d.i.v.	10分
生理食塩液 カルボプラチナ	250 mL AUC 5	d.i.v.	60分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
アセトアミノフェン1000 mg クロルフェニラミン5 mg	100 mL 1A	d.i.v.	15分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
生理食塩液 アミバンタマブ	243 mL 350 mg/body	d.i.v.	フィルター付きライン を使用のこと
<投与速度> 0~2時間:50 mL/h, 2時間以降:75 mL/h			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
<前投薬>アミバンタマブ投与30分~1時間前に内服			
Day 2, 8, 15			
アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)3錠			
Day 2			
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 9.9 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	130 mL/h
生理食塩液 アミバンタマブ	229 mL 1050 mg/body	d.i.v.	フィルター付きライン を使用のこと
<投与速度> 0~2時間:33 mL/h, 2時間以降:50 mL/h			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 8			
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液 アミバンタマブ	222 mL 1400 mg/body	d.i.v.	65 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 15			
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液 アミバンタマブ	222 mL 1400 mg/body	d.i.v.	85 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1			
グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 9.9 mg	d.i.v.	30分
生理食塩液 ペメトレキセド	100 mL 500 mg/m ²	d.i.v.	10分
生理食塩液 カルボプラチニ	250 mL AUC 5	d.i.v.	60分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
アセトアミノフェン1000 mg クロルフェニラミン5 mg	100 mL 1A	d.i.v.	15分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
生理食塩液 アミバンタマブ	222 mL 1400 mg/body	d.i.v.	125 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1			
グラニセトロンバッグ デキサメタゾン	100 mL 9.9 mg	d.i.v.	30分
生理食塩液 ペメトレキセド	100 mL 500 mg/m ²	d.i.v.	10分
生理食塩液 カルボプラチニ	250 mL AUC 5	d.i.v.	60分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
アセトアミノフェン1000 mg クロルフェニラミン5 mg	100 mL 1A	d.i.v.	15分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
生理食塩液 アミバンタマブ	215 mL 1750 mg/body	d.i.v.	125 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

薬品名	投与量	手技	点滴時間
<前投薬>アミバンタマブ投与30分～1時間前に内服			
Day 1			
アセトアミノフェン(500)2錠 ジフェンヒドラミン(10)3錠			
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 6.6 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液 ペメトレキセド	100 mL 500 mg/m ²	d.i.v.	10分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
生理食塩液 アミバンタマブ	215 mL 1750 mg/body	d.i.v.	125 mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用