

DCyBorD① 注射(1~2サイクル目)

4週毎 全身性ALアミロイドーシス

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服
 Day 1, 8, 15, 22
 アセトアミノフェン(500)2錠
 ジフェンヒドラミン(10)5錠
 *1サイクル目のDay1のみモンテルカスト(10)1錠

Day 1, 8, 15, 22

グラニセトロンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
デキサメタゾン	39.6 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	60分
-------	--------	--------	-----

ダラキューロ®	1800mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	-------------	------	-----------

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
シクロホスファミド	300 mg/m ²		最大500 mg

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

生理食塩液	1.2 mL		
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²	s.c.	

DCyBorD② 注射(3~6サイクル目)**4週毎 全身性ALアミロイドーシス**

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
	<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服			
	Day 1, 15			
	アセトアミノフェン(500)2錠			
	ジフェンヒドラミン(10)5錠			
Day 1, 15	グラニセトロンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
	デキサメタゾン	39.6 mg		
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	60分
	ダラキューロ®	1800mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	シクロホスファミド	300 mg/m ²		最大500 mg
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
	生理食塩液	1.2 mL	s.c.	
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²		
Day 8, 22	グラニセトロンバッグ	100 mL	d.i.v.	30分
	デキサメタゾン	39.6 mg		
	生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
	シクロホスファミド	300 mg/m ²		最大500 mg
	生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
	生理食塩液	1.2 mL	s.c.	
	ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²		

DCyBorD③ 注射(7サイクル目以降)**4週毎 全身性ALアミロイドーシス**

	薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1	レナデックス®	20 mg/body	p.o.	前投薬として内服
	<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服			
	Day 1			
	アセトアミノフェン(500)2錠			
	ジフェンヒドラミン(10)5錠			
	ダラキューロ®	1800mg/body	s.c.	3~5分かけて投与