

DCyBorD① 内服(1~2サイクル目)

4週毎 全身性ALアミロイドーシス

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 レナデックス®	20 mg/body	p.o.	Day1, 8, 15, 22は前投薬として内服

＜前投薬＞ダラキュー口®投与1~3時間前に内服
Day 1, 8, 15, 22
アセトアミノフェン(500)2錠
ジフェンヒドラミン(10)5錠
ラモセトロン(0.1)1錠
*1サイクル目のDay1のみモンテルカスト(10)1錠

Day 1, 8, 15, 22

ダラキュー口®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
シクロホスファミド	300 mg/m ²	p.o.	最大500 mg
ボルテゾミブ 生理食塩液(20mL) (1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)	1.3 mg/m ² 1本	s.c.	

DCyBorD② 内服(3~6サイクル目)

4週毎 全身性ALアミロイドーシス

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23 レナデックス®	20 mg/body	p.o.	Day1, 15は前投薬として内服

＜前投薬＞ダラキュー口®投与1~3時間前に内服
Day 1, 15
アセトアミノフェン(500)2錠
ジフェンヒドラミン(10)5錠
ラモセトロン(0.1)1錠

Day 1, 15

ダラキュー口®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	--------------	------	-----------

Day 1, 8, 15, 22

シクロホスファミド	300 mg/m ²	p.o.	最大500 mg
ボルテゾミブ 生理食塩液(20mL) (1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)	1.3 mg/m ² 1本	s.c.	

DCyBorD③ 内服(7サイクル目以降)

4週毎 全身性ALアミロイドーシス

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1 レナデックス®	20 mg/body	p.o.	前投薬として内服

＜前投薬＞ダラキュー口®投与1~3時間前に内服
Day 1
アセトアミノフェン(500)2錠
ジフェンヒドラミン(10)5錠

ダラキュー口®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	--------------	------	-----------