

Isakd weekly①(1サイクル目)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
<前投薬>イサツキシマブ投与15分～1時間前に内服			
Day 1, 8, 15, 22			
アセトアミノフェン(500)2錠			
Day 1			
生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	39.6 mg	d.i.v.	15分
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ファモチジン20 mg	1A		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	フィルター付きライン
イサツキシマブ	10 mg/kg		を使用のこと
<投与速度> 0～1時間:25 mL/h, 1～1.5時間:50 mL/h, 1.5～2時間:75 mL/h,			
2～2.5時間:100 mL/h, 2.5～3時間:125 mL/h, 3時間以降:150 mL/h			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	20 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	1本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 8			
生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	39.6mg	d.i.v.	15分
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ファモチジン20 mg	1A		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	フィルター付きライン
イサツキシマブ	10 mg/kg		を使用のこと
<投与速度> 0～0.5時間:50 mL/h, 0.5～1時間:100 mL/h, 1時間以降:200 mL/h			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(100 mL)	1本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

Day 15

生理食塩液	50 mL			
デキサメタゾン	39.6mg	d.i.v.	15分	
クロルフェニラミン5 mg	1A			
ファモチジン20 mg	1A			
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分	
生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	200mL/h	フィルター付きライン を使用のこと
イサツキシマブ	10 mg/kg			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分	
5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分	
カルフィゾミブ	56 mg/m ²			
注射用水(100 mL)	1本			カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.		フラッシュ用

Day 22

生理食塩液	50 mL			
デキサメタゾン	39.6 mg	d.i.v.	15分	
クロルフェニラミン5 mg	1A			
ファモチジン20 mg	1A			
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分	
生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	200mL/h	フィルター付きライン を使用のこと
イサツキシマブ	10 mg/kg			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.		フラッシュ用

IsaKd weekly②(2サイクル目以降)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
<前投薬>イサツキシマブ投与15分～1時間前に内服			
Day 1, 15			
アセトアミノフェン(500)2錠			
Day 1, 15			
生理食塩液 デキサメタゾン クロルフェニラミン5 mg ファモチジン20 mg	50 mL 39.6 mg 1A 1A	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液 イサツキシマブ	全量250 mL 10 mg/kg	d.i.v.	200mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ 注射用水(100 mL)	100 mL 56 mg/m ² 1本	d.i.v.	30分 カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 8			
生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 39.6 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ 注射用水(100 mL)	100 mL 56 mg/m ² 1本	d.i.v.	30分 カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 22			
レナデックス®	40 mg/body	p.o.	