

IsaVRd①(1サイクル目)

6週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~14, 22~35			
レナリドミド	25 mg/body	p.o.	
Day 2, 4, 5, 9, 11, 12, 23, 25, 26, 30, 32, 33			
レナデックス®	20 mg/body	p.o.	75歳以上はDay 4, 11, 25, 32
＜前投薬＞イサツキシマブ投与15分～1時間前に内服 Day 1, 8, 15, 22, 29 アセトアミノフェン(500)2錠			
Day 1			
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²		
生理食塩液(20mL)	1本	s.c.	
(1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)			
生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	19.8 mg	d.i.v.	15分
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ファモチジン20 mg	1A		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	フィルター付きライン
イサツキシマブ	10 mg/kg		を使用のこと
＜投与速度＞ 0～1時間:25 mL/h, 1～1.5時間:50 mL/h, 1.5～2時間:75 mL/h, 2～2.5時間:100 mL/h, 2.5～3時間:125 mL/h, 3時間以降:150 mL/h			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 4, 11, 25, 32			
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²		
生理食塩液(20mL)	1本	s.c.	
(1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)			
Day 8			
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²		
生理食塩液(20mL)	1本	s.c.	
(1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)			
生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	19.8mg	d.i.v.	15分
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ファモチジン20 mg	1A		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	フィルター付きライン
イサツキシマブ	10 mg/kg		を使用のこと
＜投与速度＞ 0～0.5時間:50 mL/h, 0.5～1時間:100 mL/h, 1時間以降:200 mL/h			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

Day 15

生理食塩液	50 mL			
デキサメタゾン	19.8mg			
クロルフェニラミン5 mg	1A			
ファモチジン20 mg	1A			
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分	
生理食塩液 イサツキシマブ	全量250 mL 10 mg/kg	d.i.v.	200mL/h	フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.		フラッシュ用

Day 22, 29

ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²			
生理食塩液 (20mL)	1本	s.c.		
(1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)				
生理食塩液	50 mL			
デキサメタゾン	19.8mg	d.i.v.	15分	
クロルフェニラミン5 mg	1A			
ファモチジン20 mg	1A			
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分	
生理食塩液 イサツキシマブ	全量250 mL 10 mg/kg	d.i.v.	200mL/h	フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.		フラッシュ用

IsaVRd②(2~4サイクル目)

6週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~14, 22~35			
レナリドミド	25 mg/body	p.o.	
Day 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 33			
レナデックス®	20 mg/body	p.o.	75歳以上はDay 4, 8, 11, 22, 25, 32
＜前投薬＞イサツキシマブ投与15分～1時間前に内服			
Day 1, 15, 29 アセトアミノフェン(500)2錠			
Day 1, 29			
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²		
生理食塩液(20mL)	1本	s.c.	
(1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)			
生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	19.8 mg	d.i.v.	15分
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ファモチジン20 mg	1A		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液 イサツキシマブ	全量250 mL 10 mg/kg	d.i.v.	200mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
Day 4, 8, 11, 22, 25, 32			
ボルテゾミブ	1.3 mg/m ²		
生理食塩液(20mL)	1本	s.c.	
(1Vあたり生理食塩水1.2 mLで溶解)			
Day 15			
生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	19.8mg	d.i.v.	15分
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ファモチジン20 mg	1A		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液 イサツキシマブ	全量250 mL 10 mg/kg	d.i.v.	200mL/h フィルター付きライン を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

IsaVRd③(5~17サイクル目)**4週毎**

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~21			
レナリドミド	25 mg/body	p.o.	
Day 8, 22			
レナデックス®	20 mg/body	p.o.	
<前投薬>イサツキシマブ投与15分~1時間前に内服			
Day 1, 15 アセトアミノフェン(500)2錠			
Day 1, 15			
生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	19.8mg		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
ファモチジン20 mg	1A		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	200mL/h フィルター付きライン
イサツキシマブ	10 mg/kg		を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

IsaVRd④(18サイクル目以降)**4週毎**

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~21			
レナリドミド	25 mg/body	p.o.	
Day 8, 15, 22			
レナデックス®	20 mg/body	p.o.	
<前投薬>イサツキシマブ投与15分~1時間前に内服			
Day 1 アセトアミノフェン(500)2錠			
Day 1			
生理食塩液	50 mL		
デキサメタゾン	19.8mg		
クロルフェニラミン5 mg	1A	d.i.v.	15分
ファモチジン20 mg	1A		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
生理食塩液	全量250 mL	d.i.v.	200mL/h フィルター付きライン
イサツキシマブ	10 mg/kg		を使用のこと
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用